

Šetrné hospodaření v podhůří Beskyd

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JOSEFA FOLTY

V členité krajině Podbeskydské pahorkatiny, ve které se mozaikovitě střídá zemědělská půda s listnatými a smíšenými lesíky, remízky a rozptýlenou zelení, hospodaří Ing. Josef Folta ekologicky od roku 1996. Předností zemědělské usedlosti v Kateřiních je její ucelenost – louky, pastviny i orná půda na sebe navazují a jsou propojeny zemědělsky nevyužívanými, ale přírodně významnými prvky. Harmonická, rostlinnými i živočišnými druhy bohatá krajina je výsledkem promyšleného a šetrného hospodaření.



Předností ekologické farmy je její ucelenost



Sad poskytuje ovoce starých odrůd a je příznivým prostředím pro četné druhy ptáků



Telata jsou až do odstavu s matkami na pastvě

Josef Folta chová krávy bez tržní produkce mléka, obhospodařuje louky a pastviny, na orné půdě pěstuje pohanku, trávy a jetel na semeno. V sadě pěstuje původní odrůdy ovocných stromů – hrušky (např. *chavreuska*), jablka (např. *moravská jadernička*, *matčino*, *šípkové růžové*, *lebelovo*, *soudeček*, *krasokvět*) a švestky.

Chov krav bez tržní produkce mléka je v současné době nejrozšířenější způsob hospodaření na travních porostech, ve kterém jsou krávy připouštěny býky masných plemen a veškeré mléko patří telatům.

Ta mají na pastvě volný přístup k matkám a setrvávají s nimi až do odstavu.

PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE TYPICKÉ:

- nižší intenzita obhospodařování půdy
- nepoužívání syntetických prostředků ochrany rostlin, minerálních hnojiv, geneticky modifikovaných organismů
- rozmanité oseední postupy a pěstování odolných odrůd
- péče o půdu a její úrodnost – dodávání organické hmoty podporuje biologickou aktivitu
- používání užitečných organismů (např. sluníček, hub a bakterií)
- dobré podmínky pro chovaná hospodářská zvířata



Plemeno charolais je jedním z nejrozšířenějších masných plemen francouzského původu

Harmonie člověka s přírodou

MÍSTA PRO PŘÍRODU V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

Většina území naší republiky je zásadním způsobem ovlivňována zemědělskou prvovýrobou. Klasické, tradiční hospodaření přizpůsobené místním podmínkám může podstatně přispívat k vysoké přírodní rozmanitosti. Prolínání agroekosystémů s místní krajinou vytváří specifická místa příznivá pro rostliny i živočichy.

Tato „místa pro přírodu“ najdete na zemědělské usedlosti pana Foly. Kvetoucí meze podél cest, keřové a stromové linie mezi poli a loukami, remízky.

V travních porostech zcela převažují mezofilní typy ovsíkových lučních porostů *Arrhenatherion* s druhy jako ovsík vyvýšený *Arrhenatherum elatius*, zvonek rozkladitý *Campanula patula*, kopretina bílá *Leucanthemum vulgare*. Na mírných jižních svazích vidíte mezernaté širokolisté suché trávníky *Bromion erecti* s teplomilnými a suchomilnými druhy jako pryskyřník mnohokvětý *Ranunculus polyanthemos*, řepík lékařský *Agrimonia eupatoria*, čičorka pestrá *Coronilla varia*, chrpa čekánek *Centaurea scabiosa* a v nivě horního toku potoka Rakovec najdete zachovalé fragmenty vlhkých pcháčových luk *Calthion* provázené pcháčem zelinným *Cirsium oleraceum* a pcháčem potočným *Cirsium rivulare*.




Bylinky luk a pastvin
štirovník růžkatý *Lotus corniculatus* řepík lékařský *Agrimonia eupatoria* zvonek rozkladitý *Campanula patula*



Nesečené pestré lemy poskytují potravu i útočiště hmyzu, ptákům i dalším živočichům.



Ťuhák obecný *Lanius collurio* – prospívá v křovinaté krajině s poli a hustými trnitými keři



Bramboreček hnědý *Saxicola rubetra* vyhledává vlhké louky s vtroušenými skupinami křovisek

V průběhu roku zde můžete pozorovat přes 85 ptačích druhů, z toho 52 hnízdících. Nad poli stoupá vzhůru skřivan polní *Alauda arvensis* nebo krouží moták pochop *Circus aeruginosus*. V porostech keřů a křovinatých pásech zaslechnete zpěv pěnice hnědokřídle *Sylvia communis* či pěnice slavíkové *Sylvia borin*. Mezi nejrozšířenější ptáky místních lesíků patří linduška lesní *Anthus trivialis*, pěvuška modrá *Prunella modularis*, červenka obecná *Erithacus rubecola*, budníček menší *Phylloscopus collybita*, sýkora modřinka *Parus caeruleus*, sýkora koňadra *Parus major*.